

применением внимательно прочитать!

Клопоед®

ВОДОРАСТВОРIMЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

ОПИСАНИЕ: инсектицидное средство в форме водорастворимого концентрата в виде прозрачной жидкости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.


Для приготовления рабочего раствора необходимо средство разбавить водой комнатной температуры в нужной пропорции.

концентрация рабочего раствора, % по д.в.	расход препарата	расход воды	соотношение
0,01%	10 мл	20 л	1:2000
0,02%	10 мл	10 л	1:1000
0,1%	10 мл	2 л	1:200
0,5%	100 мл	4 л	1:40
1%	100 мл	2 л	1:20

Рабочий раствор наносят валиком, кистью, тампоном или другим споручным материалом на места обнаружения, скопления или возможного обитания насекомых.

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ КЛОПОВ

СТЕНЫ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСА, ПОДОКОННИКИ, МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ БЫТА



Использовать 1,0% (по д.в.) раствор средства при норме расхода 100 мл/1 м² поверхности. Обрабатывать места обитания клопов: щели в стенах, полу и мебели, участки за плинтусами, подоконники, обратную сторону картин, ковров, места отхождения обоев и т.п. Постельные принадлежности не обрабатывать! Обработку проводить одновременно во всех помещениях, где обнаружены клопы, и в помещениях, смежных с ними, с целью предотвращения возможного расселения насекомых.

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ТАРАКАНОВ

СТЕНЫ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСА, ПОДОКОННИКИ, МЕБЕЛЬ, ПОВЕРХНОСТИ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Использовать 0,5% или 1,0% (по д.в.) раствора средства при норме расхода 50 мл/1 м² на не впитывающей влагу поверхности или 100 мл/1 м² на впитывающей влагу поверхности. Обрабатывают места обитания тараканов и пути их проникновения в помещение: щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, участки поверхности вдоль труб водопроводной и канализационной систем, щели в стенах, полу, за дверными коробками, заднюю сторону предметов обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи, картины). Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой степени заселенности тараканами следует обрабатывать средством смежные помещения с целью их ограждения от заселения насекомыми. Погибших и парализованных насекомых следует систематически сметать и уничтожать (сжигать, спускать в канализацию, выбрасывать в мусоросборник).

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ БЛОХ

Использовать 0,1% (по д.в.) раствора средства при норме расхода 100 мл/1 м² обрабатываемой поверхности. В помещении обрабатывают поверхность пола, щели в полу и за плинтусами, стены на высоту до 1 м, обратную сторону ковров и т.п. Также обрабатывают подстилки и коврики для животных, которые перед дальнейшим использованием необходимо вытряхивать и обязательно стирать.

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ МУРАВЬЁВ В ПОМЕЩЕНИИ

Обрабатывать средством скопления насекомых и пути их передвижения («дорожки»). Использовать 0,1% (по д.в.) раствора средства при норме расхода 100 мл/1 м² поверхности.

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ МУХ

Использовать жидкие приманки с концентрацией 0,5-1,0% (по д.в.) раствора средства в 10% сахарном сиропе, которые можно размещать в плоских ёмкостях или наносить кистью на места посадки мух в помещениях. Для приготовления 1 л сиропа необходимо 100 г сахара смешать с 1 л тёплой воды и перемешать до полного растворения сахара. Затем приготовить приманку требуемой концентрации, смешав средство с сиропом. Норма расхода приманки составляет 100 мл/1 м² обрабатываемой поверхности, либо три ёмкости с приманкой на помещение площадью 10 м². Повторные обработки проводить по мере необходимости.

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛИЧИНОК КОМАРОВ

Водоёмы различного типа (естественные или искусственные), противопожарные ёмкости, садовые бочки для полива и другие ёмкости, приспособленные для сбора воды, обработать 0,01-0,02% (по д.в.) раствором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: обработку помещений проводить в отсутствие людей, домашних животных и птиц, при открытых окнах. Продукты, посуду, детские игрушки и аквариумы перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть. Помещение после обработки следует проветрить не менее 30 минут. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При попадании в глаза – обильно промыть их под струей воды не менее 10 минут и закапать 10% или 30% раствор сульфацила натрия. При появлении раздражения слизистой оболочки – закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности – 2% раствор новокaina. При попадании на кожу – аккуратно снять средство тампоном, не вти-

рая, и вымыть кожу водой с мылом. При отравлении через дыхательные – пути вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух, снять загрязнённую одежду, прополоскать рот водой или 2 % раствором пищевой соды. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот тёплой водой, после чего выпить 1-2 стакана воды с активированным углём (10-15 таблеток). Лица с аллергическими заболеваниями или высокочувствительные к химическим или лекарственным веществам должны применять средство с осторожностью. Уборку помещений проводят в перчатках, используя мыльно-содовый раствор (30-50 г кальцинированной соды на 1 л воды). При работе со средством запрещается курить, принимать пищу и пить в обрабатываемом помещении. После окончания работы со средством – прополоскать рот водой, вымыть руки и лицо водой с мылом. При появлении признаков дискомфорта состояния – прекратить использование средства, рот и носоглотку прополоскать водой, помещение проветрить.

МЕРЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: не допускать попадания

средства в сточные (поверхностные), подземные воды и канализацию. **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:** допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность средства и тары, действующими на данном виде транспорта. При нарушении целостности упаковки и случайному разливу средства – засыпать его сорбирующими материалом (песок, опилки, ветошь), затем сбрать для последующей утилизации. Загрязнённое место обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 л воды), затем смыть обильным количеством воды. **ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И НОМЕР ПАРТИИ:** см. на упаковке. **СРОК ГОДНОСТИ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 4 года в не-вскрытой упаковке изготовителя. **ОБЪЁМ УПАКОВКИ:** 100 мл. **ОБЪЁМ КРЫШКИ-ДОЗАТОРА:** 7 мл. ТУ 20.20.14-240-18015953-2017. **НОМЕР ГОС. РЕГИСТРАЦИИ:** RU.77.99.88.002.E.004902. 11.17 (Таможенный союз Республика Беларусь, Казахстан и Российской Федерации). **ХРАНИТЬ** средство следует в заводской упаковке, вдали от открытого огня, в местах, защищённых от света

и нагрева, отдельно от пищевых продуктов, кормов для животных и лекарственных препаратов при температуре не ниже -25 °C и не выше +35 °C в помещении, недоступном для детей и домашних животных. Использовать только по назначению. Использованную тару выбросить в мусоросборник. **РЕГИСТРАНТ И ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ЗАО Фирма «Август», Россия, ОГРН № 1025006038958. **АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:** 142432, Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Черноголовка, бульвар Спортивный, д. 9. **ОФИС:** 129515, Москва, ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495) 787-84-99, sogporate@avgust.com, www.avgust.com. **СКЛАД:** 140053, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, мкрн Силикат, промзона, стр. 4, тел.: (495) 647-07-49. **ПРОИЗВЕДЕНО** на Филиале ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», 429120, Россия, Чувашская Республика, пос. Вурнары, ул. Заводская, д. 1, тел./факс: (83537) 2-58-01.

ТОКСИЧНО! Применять в строгом соответствии с утвержденной инструкцией.

КЛОПОЕД® – зарегистрир. товарный знак ЗАО Фирма «Август», Россия.

Рекомендации по применению см. внутри

КЛОПОЕД®

ВОДРАСТВОРИМЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

Инсектицидное средство

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
КЛОПОВ, А ТАКЖЕ
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ, БЛОХ,
МУХ И ЛИЧИНОК КОМАРОВ
населением в быту.

СОСТАВ СРЕДСТВА:
имидаクロロ (18,2%),
эмультгаторы, растворитель.

Система менеджмента
соответствует международным
стандартам OHSAS 18001:2007,
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

