

Краткая инструкция по применению средства

«Авалон к.э.».

Средство инсектоакарицидное «Авалон к.э.» представляет собой концентрат эмульсии в виде прозрачной жидкости желтоватого цвета. Содержит в качестве действующего вещества темефос 50%, стабилизатор, эмульгатор, консервант, растворитель. Средство обладает острым инсектоакарицидным действием в отношении тараканов, клопов, блох, муравьев, имаго и личинок комаров и крысиных клещей. Остаточная активность сохраняется в течение 1-2 недель. Средство по степени воздействия на организм теплокровных относится к 3 классу умеренноопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. Для приготовления рабочих суспензий средство разводят водой комнатной температуры, равномерно перемешивая. Готовую эмульсию стоит использовать в течение 8 часов после приготовления. Перед употреблением взболтать.

Количество средства «Авалон», необходимого для приготовления рабочих суспензий.

Концентрация (%) по ДВ	Концентрация (%) рабочей эмульсии по препарату	Концентрация средства (г) на (л)		
		1	10	100
0,1	0,2	2	20	200
0,5	1,0	10	100	1000
1,0	2,0	20	200	2000

- Для уничтожения американских и рыжих тараканов используют концентрацию 0,5-1,0% (по ДВ).
- Для уничтожения клопов используют концентрацию 0,5% (по ДВ).
- Для уничтожения блох используют концентрацию 1,0% (по ДВ).
- Для уничтожения рыжих домовых и других видов муравьев используют концентрацию 1,0% (по ДВ).
- Для уничтожения имаго комнатных и других видов мух используют концентрацию 0,5-1,0% (по ДВ).
- Для уничтожения имаго комаров используют концентрацию 1,0% (по ДВ).
- Для уничтожения крысиных клещей используют концентрацию 0,5-1,0% (по ДВ).

Для нанесения средства используется распыливающая аппаратура различных марок. При работе с рабочими водными суспензиями используют распыливающую аппаратуру различных марок. Норма расхода рабочей водной суспензии составляет 50 мл/м² (не впитывающая влагу поверхность) и 100 мл/м² (впитывающая влагу). Убирают средство с обработанных поверхностей не ранее, чем через 2-4 недели после потери его эффективности. Обработку помещений следует проводить в отсутствие людей, домашних животных, птиц, рыб, при открытых окнах. Продукты и посуду перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть, мебель также

тщательно укрыть. При обработке цехов промышленных предприятий предварительно убрать и тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать средство. После проведения дезинсекции помещение следует хорошо проветрить не менее 30 минут и провести влажную уборку с использованием мыльно-содового раствора. В детских учреждениях обработку следует проводить только в отсутствие детей в санитарные или выходные дни, предварительно вынести все игрушки из помещений. Помещениями, обработанными средством, нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят не позднее, чем за 3 часа до использования объекта по назначению. Каждые 45-50 минут работы с препаратом стоит делать перерыв 10-15 минут. Уборку проводят в перчатках, используя содовый раствор (30-50 г кальцинированной соды на 1 л воды). Помещение убирают при открытых окнах и форточках. Работающие со средством должны соблюдать следующие меры предосторожности: перед началом работы со средством дезинструктор проводит инструктаж по технике безопасности и мерам оказания первой помощи. Лица, проводящие дезинсекцию, расфасовку средства, приготовление суспензий, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты. Хранить средство следует в сухом, закрытом, темном, прохладном складском помещении в закрытой упаковке, при температуре не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C, вдали от источников огня и солнечного света, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов, в не доступных для детей местах.

Для получения подробной инструкции нужно отправить запрос на электронную почту: info@biotorg.com или написать в нашу группу вконтакте: <https://vk.com/biotorg29>