

Торнадо Экстра гербицид (от сорняков)

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ

[Торнадо Экстра](#) - универсальный гербицид сплошного действия с повышенным содержанием действующего вещества для уничтожения однолетних и многолетних сорняков и нежелательной древесно-кустарниковой растительности. Торнадо проникает в сорные растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам сорняков, достигая их корневой системы. Гербицид блокирует синтез ароматических аминокислот, что приводит к поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных органов. На семена Торнадо не действует. Видимые симптомы гербицидного воздействия на однолетние сорняки становятся заметны через 4 – 5 дней, на многолетние – через 7 – 10 дней, на древесно-кустарниковую растительность и камыши – на 20 - 30-й день после обработки и проявляются в виде пожелтения, затем побурения растений, усыхания листьев. Позже происходит отмирание стеблей, подземных побегов, корней и корневищ.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Для уничтожения более 150 видов сорной растительности можно использовать препарат Торнадо. Устоять против мощного гербицида сплошного действия не смогут ползучий пырей, бодяк, амброзия, свинорой, вьюнок, кустарники, древесная поросль и др.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В жару и засуху следует опрыскивать сорные растения утром или вечером. При сильной засухе обработка не рекомендуется!
- Если листья сорняков покрыты слоем пыли, гербицид плохо поступает в растения, поэтому лучше провести обработку после того, как пройдет дождь и смоет пыль с поверхности листьев.
- Не следует проводить обработку при вероятности выпадения осадков в течение 4 - 6 ч после опрыскивания.
- Не следует опрыскивать при скорости ветра свыше 5 м/с.
- Избегать сноса препарата на культурные растения и лесополосы.
- Для высокоэффективной борьбы с многолетними сорняками культивацию почвы желательно проводить не ранее, чем через две недели после обработки.
- Культивация в более ранние сроки может существенно снизить ее эффективность.
- Также необходимо учитывать фазу развития многолетних сорняков в момент опрыскивания – их следует обрабатывать в период преимущественного оттока пластических веществ в корневую систему.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание вегетирующих сорняков рабочей жидкостью препарата. Перед применением [Торнадо Экстра](#) следует тщательно перемешать в заводской упаковке. Для приготовления рабочей жидкости резервуар опрыскивателя заполнить на 1/3 водой, добавить необходимое количество препарата и тщательно взболтать до полного растворения. Далее долить воду до необходимого объема и еще раз тщательно взболтать. Рабочая жидкость должна быть использована в день приготовления. Не рекомендуется опрыскивать перед дождем! Регламенты применения приведены в таблице.

Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Норма расхода препарата	Способ, время обработки, особенности применения
Участки, предназначенные под посев газонных трав	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	30 мл/3 л воды	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных трав. Расход рабочей жидкости: 3л/100 м ²
	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. борщевик	40 мл/3 л воды	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 14 дней до посева газонных трав. Расход рабочей жидкости: 3л/100 м ²

Участки, не предназначенные под посев (посадку) культурных растений (обочины дорог, вдоль изгороди и т.д.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. борщевик	40 мл/3 л воды	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости: 3 л/100 м ²
	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	30-50 мл/3 л воды	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости: 3 л/100 м ²

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ КУЛЬТУР

Препарат фитотоксичен по отношению ко всем растительным объектам при контакте с вегетирующими надземными органами. Транслокация глифосата в растение или семена через почву не происходит. Поэтому культурные растения можно высаживать или высевать на обработанные участки через 2 - 4 дня после внесения препарата.

СОСТАВ

500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль).

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЯ

Срок годности 60 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухом, недоступном для детей и животных месте при температуре от - 15 до + 40 °С.

Купить [гербицид Торнадо Экстра от сорняков](#) можно в магазине «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com/>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+78182460235)